

Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne Charente Atlantique

Antenne de La Rochelle

CQE 17 du 6 décembre 2018

-

Etat de la ressource en eau superficielle


Situation au 20 novembre 2018



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Bassin de la Sèvre Niortaise







A mi novembre, les débits à Niort (La Tiffardière) sur La Sèvre Niortaise se situent au niveau de la normale (3 ans sec sur VCN3).

Bassin de la Charente







A mi novembre, les débits à Saint-Séverin-sur-Boutonne (Moulin de Châtre) sur La Boutonne se situent au niveau de la normale (3 ans sec).



A mi novembre, les débits à Salles d'Angles (les Perceptiers) sur Le Né se situent au niveau de la normale (2 ans humide).




A mi novembre, les débits à Saint-Seurin-de-Palenne (la Lijardière) sur La Seugne se situent au niveau de la normale (2 ans sec).



A mi novembre, les débits à Chaniers (Beillant) sur La Charente se situent au niveau de la normale (3 ans sec).

Bassin de la Seudre





A mi novembre, les débits à St André de Lidon sur La Seudre se situent au niveau de la normale (2 ans sec).

Conclusion

En cette fin d'automne, après un étiage tardif et relativement long mais modéré, les débits actuellement mesurés se situent en majorité au niveau des normales.

